Scheda tecnica informativa **Rev.: 05/11/2012**

KASTEL

DISINFETTANTE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. Min. della Salute n. 17498

Composizione	**Principio attivo:** Sodio Ipoclorito g 1,12 **Eccipienti:** Sodio cloruro g 17,60 - Acqua depurata q.b. a 100 ml
Caratteristiche chimico-fisiche	Liquido limpido di colore leggermente paglierino, con lieve odore di cloro.
Meccanismo d'azione	L'elevata attività antisettica e disinfettante deriva dall'azione sinergica dell'Ossigeno allo stato nascente che si libera in soluzione acquosa dal Cloro Attivo Elettrolitico e dall'ossidazione irreversibile dei gruppi sulfidrilici di alcuni enzimi essenziali del metabolismo energetico della cellula microbica.
Spettro d'azione	Tra i disinfettanti, il Cloro Attivo Elettrolitico è uno dei più energici ed è attivo su batteri gram+ e gram-, funghi e virus. Inoltre, le soluzioni di ipoclorito sono efficaci nella disinfezione della biancheria, di ambienti e superfici nella prevenzione del virus dell'AIDS.
Istruzioni per l'uso	**Applicazioni:** disinfettante d'uso personale; disinfezione di frutta e verdura; disinfezione dell'acqua da bere in caso di necessità.
Modalità d'uso	**Puro o poco diluito:** disinfezione della cute integra prima delle iniezioni. **Soluzioni al 10%:** disinfezione della mani e delle ascelle. **Soluzioni al 5%:** impacchi e lavaggi disinfettanti della cute integra, pediluvi disinfettanti (tempo di contatto 5') **Soluzioni al 2%:** disinfezione di poppatoi, tettarelle, stoviglie ed oggetti non metallici che il bambino normalmente usa (lasciare nella soluzione per 90 minuti. Al momento dell'utilizzo risciacquare con acqua potabile). **Soluzioni al 2%:** disinfezione di frutta e verdura (lasciare nella soluzione per 15-20 minuti e risciacquare con acqua potabile).
Controllo qualità	KASTEL Disinfettante è prodotto e controllato in conformità alla Normativa vigente sui Presidi Medico Chirurgici.
Sicurezza	Alle concentrazioni d'uso KASTEL non è ne tossico, ne irritante. Il prodotto non rientra nella classificazione dei preparati pericolosi. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza del preparato.
Avvertenze	Seguire le indicazioni riportate in etichetta. "Attenzione: non utilizzare insieme al altri prodotti. Può emettere gas pericolosi (cloro)". Non ingerire. In caso di ingestione accidentale l'antidoto è il tiosolfato di sodio; ricorrere all'assistenza medica. Non portare a contatto con cute lesa o mucose. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Il prodotto può sbiancare alcuni tessuti e macchiare gli indumenti.
Modalità di conservazione	Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce solare diretta, da fonti di calore e dalle elevate temperature.
Validità	La validità è di 3 anni (36 mesi). La data di scadenza indicata sulle confezioni si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato.
Smaltimento	**Contenitori:** i contenitori sono costituiti di polietilene. Il processo di combustione di tali materiali determina lo sviluppo CO_2 e CO come prodotti principali e alcani, alcheni dieni come prodotti secondari. Non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso. Non disperdere nell'ambiente il contenitore vuoto. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza del preparato.
Confezioni:	- Flacone da lt 1 in cartone da 12 flaconi - Tanica da lt 5 in cartone da 4 taniche

Informazioni riservate a personale qualificato

pharma trade company srl - via torazza 115-121 20861 brugherio mb
tel 039 2142186 fax 039 2872944 info@pharmatrade.it www.pharmatrade.it

pharma trade company srl - via torazza 115-121 20861 brugherio mb
tel 039 2142186 fax 039 2872944 info@pharmatrade.it www.pharmatrade.it